




Cosmetico

Metodo de Aplicacion

- Reconstitucion**
- Almacenamiento**
- Dosis (referencia)**
- Zonas de aplicacion**
- Efectos secundarios**
- Tiempo de duracion**

Reconstitucion

Fine Tox debe ser reconstituido con solucion salina (0.9% cloruro de sodio sin preservativos) antes de la inyeccion.

Tabla de dilucion como referencia:

Concentracion (U / 0.1 ml)	Volumen de diluyente (ml) Añadido	
	50 U vial	100 U vial
10.0 U / 0.1 ml	0.5 ml	1.0 ml
5.0 U / 0.1 ml	1.0 ml	2.0 ml
2.5 U / 0.1 ml	2.0 ml	4.0 ml
1.25 U / 0.1 ml	4.0 ml	8.0 ml

Normalmente cuando Fine Tox se usa para cosmetico, la dilucion es la siguiente:

100 Units (U) Fine Tox + 2.5 ml solucion salina* = 4U per 0.1 ml

or

100 U Fine Tox + 2 ml solucion salina* = 5U per 0.1 ml

- Utilice una jeringa para agregar la solucion salina en el vial
- No agitar demasiado el vial durante la dilucion para evitar burbujas dentro del vial


Almacenamiento

Fine Tox debe ser almacenado 2 to 8 °C antes de ser reconstituido. Despues de reconstituido, debe ser utilizado en su totalidad o almacenado entre 2 a 8 °C (No colocar en el congelador) e idealmente utilizar dentro de las proximas 4 horas

Dosis (referencia)

	Dosis por sitio	No. de sitios	Total dosis	Tipo de Inyeccion
Lineas Frontales	2 ~ 4 U	5 ~ 10	10 ~ 20 U	Subcutaneo / Intramuscular
Lineas Glabellares	4 U	4 ~ 5	16 ~ 20 U	Subcutaneo / Intramuscular
Patas de Gallo (cada lado)	2 U	3 ~ 6	6 ~ 12 U	Subcutaneo
Musculo del Masseter (cada lado)	Hombre	10 ~ 13 U	30 ~ 40 U	Intramuscular
	Mujer	7 ~ 10 U	20 ~ 30 U	

Sitios de Inyeccion



Efectos Secundarios

- Mareos: se resuelven de 7-10 dias (evitar tomar aspirinas antes de la inyeccion)

- Ptosis (caída del parpado): se resuelve en 2 semanas
(evitar inyección de 1cm a 1.5cm sobre la ceja y no hace masaje)
- Equimosis y edema

Los efectos secundarios son temporales y desaparecen espontáneamente.

Tiempo de efectividad

El efecto de Fine Tox dura de 5 a 7 meses, dependiendo de la respuesta individual. La efectividad de Fine Tox se mantiene por medio de inyectar de nuevo antes de que el efecto acabe.